

ADCetris® (Brentuximab Vedotin)

Krebstherapie, zeitlich dringende Anfrage

Swissmedic-Zulassung (Auszug, nur für die hier vorgesehene Indikation): Hodgkin-Lymphom

Adcetris ist für die Therapie bei unvorbehandelten erwachsenen Patienten mit CD30 positivem (+), Stadium IV Hodgkin-Lymphom (HL) in Kombination mit einer Chemotherapie mit Doxorubicin, Vinblastin und Dacarbazin (AVD) indiziert (siehe «Klinische Wirksamkeit»). Adcetris in Kombination mit AVD ist nicht mit einer BEACOPP eskalierten-Chemotherapie verglichen worden, sondern mit ABVD-Chemotherapie bestehend aus Doxorubicin, Bleomycin, Vinblastin und Dacarbazin. Siehe auch www.swissmedicin.ch.

Personalien Patientin/Patient:

Name: Vorname: Geb. Datum:

Geschlecht: ♀ ♂ Strasse: Adresszusatz:

PLZ: Ort:

Krankenversicherer: Versicherten-Nr.:

Adresse Versicherer (VAD bzw. Vertrauensarzt): Adresszusatz:

PLZ: Ort:

Medizinische Daten (ausschliesslich für de Vertrauensarzt bestimmt), Diagnose

Patientin/Patient ist an einem CD30+ Hodgkin-Lymphom erkrankt.
Stadium: Diagnose gestellt (MM/JJJJ):

Erstlinien-Therapie

Vorgesehene Therapie mit ADCetris® gemäss Fachinformation. Die empfohlene Dosierung von Adcetris in Kombination mit einer Doxorubicin, Vinblastin und Dacarbazin (AVD)-Chemotherapie beträgt 1,2 mg/kg, verabreicht als intravenöse Infusion über 30 Minuten am 1. und 15. Tag jedes 28-tägigen Zyklus; Dauer der Behandlung 6 Zyklen. Bei allen Patienten wird, beginnend mit der ersten Dosis, zur Unterstützung eine primäre Prophylaxe mit Wachstumsfaktor (Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor [G-CSF]) empfohlen. Bezüglich der Chemotherapeutika Doxorubicin, Vinblastin und Dacarbazin, die bei der Erstlinien-Therapie für Patienten mit HL zusammen mit Adcetris verabreicht werden, siehe die jeweiligen Fachinformationen. Menge pro Zyklus Adcetris = Patienten Körpergewicht x 1,2 mg. Falls Körpergewicht >100 kg, Dosis Berechnung für 100 kg anwenden.

Gewicht des Pat (kg): Benötigte Dosis (mg):

Anzahl benötigte Durchstechflaschen (50mg) pro Zyklus:

In **Kombination** mit folgenden drei Medikamenten:

1. **Medikament** (Wirkstoff und Produktnamen):

- Abgabe gemäss Fachinformation
 Andere Dosierungen (bitte auch kurz begründen), nämlich

2. **Medikament** (Wirkstoff und Produktnamen):

- Abgabe gemäss Fachinformation
 Andere Dosierungen (bitte auch kurz begründen), nämlich

3. **Medikament** Wirkstoff und Produktnamen):

- Abgabe gemäss Fachinformation
 Andere Dosierungen (bitte auch kurz begründen), nämlich

Gründe für die Therapiewahl mit ADCetris und Begründung, weshalb keine Behandlung mit einem Medikament (oder eine Kombinationstherapie) möglich ist, welches in der Spezialitätenliste für diese Indikation aufgeführt ist (bitte auch massgebliche Literatur beilegen):

Bemerkungen/Ergänzungen

Anfragender Arzt/Ärztin:

Name: Vorname:

Strasse: PLZ: Ort:

Tel. Fax: E-Mail:

bei Spital zusätzlich Name des Spitals: Abteilung:

Datum: