

ADCetris® (Brentuximab Vedotin)

Krebstherapie, zeitlich dringende Anfrage

Swissmedic-Zulassung (Auszug, nur für die hier vorgesehene Indikation): Peripheres T-Zell-Lymphom

Adcetris ist für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit zuvor unbehandeltem CD30+ peripheren T-Zell-Lymphom (PTCL) in Kombination mit einer Chemotherapie mit Cyclophosphamid, Doxorubicin und Prednison (CHP) indiziert (siehe «Klinische Wirksamkeit»). Siehe auch www.swissmedicin.ch.

Personalien Patientin/Patient:

Name: Vorname: Geb. Datum:

Geschlecht: ♀ ♂ Strasse: Adresszusatz:

PLZ: Ort:

Krankenversicherer: Versicherten-Nr.:

Adresse Versicherer (VAD bzw. Vertrauensarzt): Adresszusatz:

PLZ: Ort:

Medizinische Daten (ausschliesslich für den Vertrauensarzt bestimmt):

Patientin/Patient ist an einem CD30+ Peripheren T-Zell Lymphom erkrankt.
Subtyp: Diagnose gestellt (MM/JJJJ):

Es handelt sich um eine Erstlinien-Therapie

Vorgesehene Therapie mit ADCetris® gemäss Fachinformation. Die empfohlene Dosierung von Adcetris in Kombination mit Cyclophosphamid, Doxorubicin und Prednison (CHP) Chemotherapie beträgt 1,8 mg/kg, verabreicht als intravenöse Infusion über 30 Minuten alle 3 Wochen für 6 bis 8 Zyklen. Primäre Prophylaxe mit G-CSF (Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor) wird beginnend mit der ersten Dosis für alle Patienten empfohlen. Bezüglich der Chemotherapeutika Cyclophosphamid, Doxorubicin und Prednison, die bei der Erstlinien-Therapie für Patienten mit PTCL in Kombination mit Adcetris verabreicht werden, siehe die jeweiligen Fachinformationen.

Menge pro Zyklus Adcetris = Patientenkörpergewicht x 1,8 mg.
Falls Körpergewicht >100 kg, Dosis Berechnung für 100 kg anwenden.

Gewicht des Pat (kg): Benötigte Dosis (mg):

Anzahl benötigte Durchstechflaschen (50mg) pro Zyklus:

In **Kombination** mit folgenden drei Medikamenten:

1. Medikament (Wirkstoff und Produktnamen):

- Abgabe gemäss Fachinformation
 Andere Dosierungen (bitte auch kurz begründen), nämlich:

2. Medikament (Wirkstoff und Produktnamen):

- Abgabe gemäss Fachinformation
 Andere Dosierungen (bitte auch kurz begründen), nämlich

3. Medikament Wirkstoff und Produktnamen):

- Abgabe gemäss Fachinformation
 Andere Dosierungen (bitte auch kurz begründen), nämlich

Gründe für die Therapiewahl mit ADCetris und Begründung, weshalb keine Behandlung mit einem Medikament (oder eine Kombinationstherapie) möglich ist, welches in der Spezialitätenliste für diese Indikation aufgeführt ist (bitte auch massgebliche Literatur beilegen):

Bemerkungen/Ergänzungen

Anfragender Arzt/Ärztin:

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ:

Ort:

Tel.

Fax:

E-Mail:

bei Spital zusätzlich Name des Spitals:

Abteilung:

Datum: