

Adcetris® (Brentuximab Vedotin)

Demande de prise en charge des coûts à l'attention du médecin-conseil

Swissmedic (Extrait lymphome de Hodgkin – BrECADD):

Adcetris est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome de Hodgkin (LH) CD30+ au stade IIB avec facteurs de risque, au stade III ou au stade IV, non traités auparavant, en association avec l'étoposide, le cyclophosphamide, la doxorubicine, la dacarbazine et la dexaméthasone (BrECADD) (voir « Efficacité clinique »).

Personnalen Patientin/Patient:

Nom:	Prénom:	Date de naissance:
Sexe:	Rue:	Complément d'adresse:
<input type="checkbox"/> ♀ <input type="checkbox"/> ♂		
NPA:	Lieu:	
Assurance maladie:		Numéro d'assuré:
Adresse Assurance (Service du MC ou MC):		Complément d'adresse:
NPA:	Lieu:	

Données médicales

Adulte (≥ 18 ans) patient est atteint d'un lymphome de Hodgkin CD30+

Stade:

Diagnostic posé (MM/AAAA) :

Il s'agit d'une thérapie de première ligne

Quantité par cycle d'Adcetris = poids corporel du patient \times 1,8 mg.

Si le poids corporel est supérieur à 100 kg, appliquer le calcul de la dose pour 100 kg.

Poids du Patient (kg):

Dose nécessaire (mg):

Thérapie prévue avec Adcetris® selon l'information professionnelle

La dose recommandée en association avec une chimiothérapie (étoposide (E), cyclophosphamide (C), doxorubicine (A), dacarbazine (D), dexaméthasone (D) [BrECADD]) est de 1,8 mg/kg, administrée par perfusion intraveineuse sur 30 minutes toutes les 3 semaines pendant un maximum de 6 cycles (voir « Efficacité clinique »).

Chez tous les patients atteints de LH non traité auparavant recevant une thérapie combinée, une prophylaxie primaire avec des facteurs de croissance (G-CSF) doit être administrée à partir du 5^e jour de chaque cycle (voir « Mises en garde et précautions d'emploi »).

Un prétraitement par dexaméthasone pendant 4 jours avant le premier cycle de chimiothérapie est recommandé pour les patients de plus de 40 ans ou selon l'appréciation du médecin.

Une prophylaxie antibiotique doit être administrée 3 fois par semaine pendant toute la durée de la chimiothérapie.

Pour les recommandations de dosage des agents chimiothérapeutiques administrés en association avec Adcetris chez les patients atteints de LH non traité auparavant, voir le tableau 1.

Tableau 1 (extrait de l'information professionnelle Swissmedic): Niveaux de dosage pour le schéma thérapeutique BrECADD

Niveaux de dosage	Cyclophosphamide (C)	Doxorubicine (A)	Étoposide (E)	Dacarbazine (D)	Dexaméthasone (D)
4 (dose complète)	1250 mg/m ²	40 mg/m ²	150 mg/m ²	250 mg/m	40 mg
3	1100 mg/m ²	40 mg/m ²	125 mg/m ²	250 mg/m ²	40 mg
2	950 mg/m ²	40 mg/m ²	100 mg/m ²	250 mg/m ²	40 mg
1	800 mg/m ²	40 mg/m ²	100 mg/m ²	250 mg/m ²	40 mg
Niveau initial	650 mg/m ²	35 mg/m ²	100 mg/m ²	250 mg/m ²	40 mg

Nom du produit:

Administration selon l'information professionnelle

Administration de tous les composants du régime BrECADD conformément aux informations professionnelles

Autre dosage (notamment aussi pour les chimiothérapies selon le tableau 1, merci de justifier brièvement) à savoir

Alternatives thérapeutiques? Justification et explication de l'indication (veuillez joindre toute littérature pertinente):

Remarques/Compléments:

Médecin formulant la demande:

Nom:

Prénom:

Rue:

NPA:

Lieu:

Tél.

Fax:

E-Mail:

Exerçant à l'hôpital ajoutez le nom de l'hôpital:

Département:

Date:

voir aussi Swissmedicinfo