## Adenuric® (Febuxostat)

Limitatio: Traitement de l'hyperuricémie chronique ayant déjà entraîné des dépôts d'urate (y compris des antécédents ou la présence de tophus et/ou d'arthrite goutteuse) chez les patients adultes, pour qui l'allupurinol n'était pas suffisamment efficace, ou qui, à cause d'effets indésirables et d'intolérance, ne peuvent pas être traités avec l'allopurinol. La dose maximale comporte 80 mg/jour. Voir aussi LS.

Nom:	es du patie	nt:			Prénom:				Né le:		
sexe:		Rue:					Comple	ément d'adresse:			
<b>O</b> ♀	<b>O</b> ♂										
NPA:		Lie	eu:								
Assura	nce:	_				N° d'ass	surance.:				
Adresse Assureur (Service de médecin-conseil ou MC):						Complé	ment d'ac	nent d'adresse:			
	,										
NPA:		Lie	eu:								
		]									
Donnée	es médical	es (à l'intenti	on exclusivem	ent du mé	decin-con	seil):					
П	Le/la pat	ient(e) souffre	d'une hyperuri	cémie chro	nique ayar	nt déjà er	ntraîné de	s dépôts d'urate			
Concer		ement initial:	•			•					
Ш	Le traiter	Le traitement par allopurinol n'était pas suffisamment efficace									
	Le/la pat	toléré le traite	ment			Le/la patient(e) a présenté des effets indésirables					
	Le/la patient(e) ne peut pas être traité avec Allopurinol.										
Descrip	tion somma	nire du traitem	ent initial par al	lopurinol o	u de l'impo	ssibilité d	du traitem	ent avec allopurinol,	y compris	l'intolérance ou	
Concer	nant le traite	ement par Ade	enuric®, dosage	initial:							
0	40 mg / j	our	0	80 mg / j	jour		0	autre, préciser:		mg / jour	
Nom: Rue: Tél.	cin requé		Fax:		NPA:	Prénom	Lieu: E-Mail:				
Exerçar  Date:	и а гпоріта	ajoutez le noi	n de l'hôpital:			Départe	einent:				

Page 1 Adenuric® (Febuxostat) 4/f