

Movymia® (Teriparatid)

Demande de prise en charge

Autorisation par Swissmedic: Movymia est indiqué pour le traitement des femmes post-ménopausées avec ostéoporose avérée et risque élevé de fracture. On a démontré une réduction significative de l'incidence des fractures vertébrales et non vertébrales chez les femmes post-ménopausées avec ostéoporose. Movymia est indiqué chez les hommes avec ostéoporose primaire ou hypogonadique avec risque élevé de fracture. Movymia augmente la densité minérale osseuse chez les hommes avec ostéoporose primaire ou hypogonadique. Traitement de l'ostéoporose induite par les glucocorticoïdes chez les adultes présentant un risque accru de fracture.

Données du patient:

Nom: Prénom: né(e) le:

Sexe: ♀ ♂ Rue: Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Assurance: Numéro de l'assuré(e):

Adresse Assurance (Service du MC ou MC): Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Pour le traitement de première intention de l'ostéoporose avérée chez les femmes ménopausées et chez les hommes souffrants d'ostéoporose primaire ou hypogonadique présentant un risque très élevé de fractures.

T-score \leq - 2.5 et au moins 2 fractures vertébrales avérées (Index de Genant grade 3 ou 3)

T-score \leq - 3.5 et au moins 1 fracture vertébrale avérée (Index de Genant grade 2 ou 3)

T-score \leq - 2.5 et une fracture de la hanche

Pour le traitement de première l'intention de l'ostéoporose avérée chez les femmes ménopausées et chez les hommes souffrants d'ostéoporose primaire ou hypogonadique.

Ostéoporose induite par les glucocorticoïdes chez les adultes ayant un risque accru de fracture.

Diagnostic (uniquement pour le médecin-conseil déterminé):

Alternatives thérapeutiques? Justification et explication de la pose de l'indication pour Forsteo (veuillez joindre les publications):

Compléments/Remarques:

Médecin requérant

Nom: Prénom:

Rue: NPA: Lieu:

Tél. Fax: E-Mail:

Exerçant à l'hôpital, donner le nom de l'hôpital: Département:

Date: