

# Revestive® (Teduglutid)

## Demande de prise en charge à l'attention du médecin-conseil

**Autorisation de Swissmedic** Revestive est indiqué dans le traitement des patients âgés de 1 an et plus présentant un syndrome du grêle court et dépendant d'une nutrition parentérale. Les patients doivent être en état stable après la période d'adaptation intestinale ayant suivi l'intervention chirurgicale.

### Données du patient / de la patiente:

Nom:  Prénom:  né(e) le:

Sexe:  ♀  ♂ Poids:  kg Rue:  Complément d'adresse:

NPA:  Lieu:

Assurance-maladie:  Numéro d'assuré(e):

Adresse Assurance (Service du MC ou MC):  Complément d'adresse:

NPA:  Lieu:

### Données médicales:

- Le/La patient/e souffre d'un syndrome du grêle court et dépend d'une nutrition parentérale
- Le/La patient/e est dans un état stable et a suivi une période d'adaption intestinale après intervention chirurgicale

Etiologie du syndrome du grêle court:

Anatomie et longueur de l'intestin grêle restant:

Antécédents médicaux et complications:

Pour la nutrition parentérale: En place depuis(MM/AAAA):

Volume actuel (litres par jour) :

Investigations médicales préalables au traitement en accord avec les recommandations :

- Tomodensitométrie  Coloscopie  Fonction cardiaque
- Examens des seins  Dépistage du col de l'utérus  Évaluation nutritionnelle

Autres, compléments:

Thérapies alternatives ? Raisons de choisir la thérapie avec Revestive® (veuillez joindre la littérature):

Thérapie planifiée (extrait de l'information destinée aux professionnels)

**Adultes:** La posologie recommandée pour l'administration de Revestive s'élève à 0,05 mg/kg de poids corporel une fois par jour, par voie sous-cutanée

**Enfants et adolescents (≥1 an):** Le traitement doit être instauré sous la surveillance d'un médecin expérimenté dans la prise en charge des enfants et des adolescents atteints du syndrome du grêle court (SGC). La posologie recommandée de Revestive pour les enfants et les adolescents (âgés de 1 à 17 ans) est la même que pour les adultes (0,05 mg/kg de poids corporel par voie sous-cutanée une fois par jour). Chez les patients adultes ou les enfants ou adolescents présentant une insuffisance rénale modérée à sévère (clairance de la créatinine < 50 ml/min), voire terminale, la dose quotidienne doit être réduite de 50%. Le volume à injecter en fonction du poids corporel est indiqué dans le tableau sur le site de swissmedic (Voir aussi [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch))

Dosage demandé:  mg/kg de poids corporel une fois par jour.

Si un dosage différent de celui recommandé est utilisé, veuillez justifier :

**Médecin demandeur:**

Nom:

Prénom:

Rue:

NPA:

Lieu:

Tél.:

Fax:

E-Mail:

Exerçant à l'hôpital (ajoutez le nom de l'hôpital):

Département:

Date:

(Voir aussi [swissmedicinfo](http://www.swissmedicinfo))